

Rani karijes mliječnih zuba -stanje karakterizirano potpunim uništenjem tvrdih zubnih tkiva, posebno krune zuba, u prvome redu gornjih sjekutića. Kasnije bivaju uništeni i kutnjaci. U pravilu se takva stanja u ranoj dobi, mogu povezati s konzumacijom različitih zaslađenih napitaka iz bočice poput čaja, mlijeka ili voćnih sokova, posebno tijekom noći ili za vrijeme uspavlivanja djeteta te nedostatne oralne higijene. Svaki karijes, pa i rani karijes mliječnih zubi, rezultat je međusobna djelovanja više jednako važnih čimbenika.

- a) kariogenih mikroorganizama u ustima

- b) prehrambenih navika

- c) zubne plohe kao objekta na koji se negativno djeluje

- d) oralne higijene

Koji uzroci dovode do karijesa?

Uzroci koji pogoduju razvoju karijesa su:

- dugotrajno dojenje, pijenje bočice, posebice noću
- umakanje dudica u zaslađeni napitak, med ili šećer
- loša oralna higijena
- uzimanje slatkiša prije spavanja
- uzimanje zaslađenih čajeva, sokova ili mliječnih napitaka prije spavanja.

Početni oblik bolesti, koji se očituje kao bijele ili žute pjege na kruni zuba **RODITELJI** bi svakako trebali zamijetiti i potražiti profesionalnu pomoć. Uz stručnu pomoć moguće je u toj fazi zaustaviti bolest i tako izbjeći posljedice koje ona može uzrokovati. No ako bolest uznapreduje ona donosi određene posljedice.

- kariozno promjenjen zub je upalno žarište i rasadište bakterija koje mogu diseminirati po tijelu
- otežan izgovor nekih glasova
- otežano žvakanje i loša probava
- smetnje u razvoju čeljusti i smetnje u trajnoj denticiji (kod te djece češće je potrebna ortodontska terapija)
- narušavanje estetskog izgleda